



JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

PUBLIC HEALTH INSTITUTE
OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

JIB: 4400963610001 • MB: 1752642 B.R.U: 5-43-00 • Ž.R: 552-000-0000-5787-65 Addiko Bank a.d. • Ž.R: 562-100-80000177-30 NLB banka a.d. Banja Luka

Број: 500-6869124

Датум: 30.10.2024. године

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Н/Р МИНИСТРА

ПРЕДМЕТ: Препоруке за спречавање ширења ентеровируса, доставља се

Поштовани,

У досадашњем периоду, закључно са уторком 29.10.2024.године, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске запримио је укупно осам пријава обољења од ентеровирусног менингитиса и то: пет обољелих са подручја општине Котор Варош и три пријаве обољења са подручја Града Бања Лука. У демографском и хронолошком пресеку стања обољелих у оба града, први случај је оболио 15.10.2024 (Котор Варош), док је посљедњи пријављени случај оболио 23.10.2024.године (Котор Варош). Најмлађи обољели је 2023. годиште, док је најстарији обољели 2013. годиште.

Ентеровируси су распрострањени широм свијета и могу изазвати различите врсте инфекција код људи. Човјек је природни домаћин за већину ентеровируса. Дјеца су чешће подложна инфекцијама. Ентеровирусни менингитис се преноси феко-оралним путем. Излучују се путем столице и вирусна контаминација руку настаје усљед контакта са фекалијама. Инфекција настаје када се путем контаминираних руку вирусне честице прогутају. У неким случајевима је могућ пренос капљичним путем - путем респираторних секрета, али он је рјеђи. Инфициране особе излучују вирус столицом и из секрета ждријела неколико дана прије и неколико недјеља након почетка симптома. Највећа заразност је у почетку болести.

С обзиром да је ово болест која се најчешће преноси условно речено „прљавим рукама“ у директном и индиректном контакту, добра хигијенска пракса спречава ширење вируса и главна је мјера у сузбијању ове инфекције. С тим у вези, неопходно је да се све школске (средње и основне) и предшколске установе обавијесте и обавезу за подизање мјера личне, колективне и просторне хигијене за све запослене и дјецу.

То укључује следеће:

- прање руку топлем водом и сапуном након сваког кориштења тоалета, прије ужине, прије и након физичког васпитања или извођења практичне наставе

78 000 Бања Лука / Banja Luka
Јована Душића / Jovana Dušića 1



info@phi.rs.ba • www.phi.rs.ba

Тел / Tel: +387 (0)51 491 600
Факс / Faks: +387 (0)51 216 510; 215 751

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске поседује систем управљања квалитетом BAS EN ISO 9001:2015 сертификован од стране IUQS д.о.о. Београд

- прање руку топлом водом и сапуном прије и након пресвлачења пелена
- на излазе из тоалета потребно је поставити дезинфекциона средства.
- редовно провјетравање
- покривање уста и носа код кашљања или кихања
- дезинфекција подова школских и предшколских установа најмање једном дневно
- дјеца у вртићима да не доносе играчке од куће и не мијешати играчке између вртићких група
- да болесна дјеца, нарочито дјеца са симптомима сличне природе, не похађају у том периоду предшколску или школску установу.
- радници којима је то обавеза да носе прописану радну одјећу
- правилно одржавање хигијене кухиње и мокрих чворова

Поред тога, потребно је родитељима и представницима школских и предшколских установа обезбиједити основне информације о преносу и симптомима ове болести и дати препоруку за јављање надлежном доктору у случају појаве тегоба.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОРА
 Бојан Ђенић, дипломирани правник



1. Наслову,
2. Служби за епидемиологију,
3. Евиденцији,
4. Министарству здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске.